

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

stagione 2015 - 2016

COSA FARE PER PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI



LAVARE LE MANI

accuratamente e più volte al giorno, sempre con acqua e sapone (in particolare dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiati il naso)



TOSSIRE O STARNUTIRE

Quando si tossisce, tenere un fazzoletto di carta davanti al naso e alla bocca



GETTARE IL FAZZOLETTO DI CARTA

Dopo l'uso gettare sempre il fazzoletto di carta nel cestino dei rifiuti e lavarsi le mani accuratamente con acqua e sapone

Per ulteriori informazioni www.ausl.vda.it/home page




DIFENDI

LA TUA SALUTE

SCEGLI DI

VACCINARTI



Assessorat du Santé du Bien-être et des Prévention sociales Assessorate Sanità, Saùze e Perliche social

A CHI È CONSIGLIATA LA VACCINAZIONE?

1. **Soggetti di età pari o superiore a 65 anni**
2. **Soggetti in età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da:**
 - malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma persistente, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e le broncopatie cronico ostruttive - BPCO)
 - malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
 - diabete mellito e altre malattie metaboliche
 - malattie renali con insufficienza renale
 - malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
 - tumori
 - malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
 - malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
 - patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
 - patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad esempio malattie neuromuscolari)
3. **Bambini e adolescenti in trattamento** a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
4. **Donne** che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e **terzo mese di gravidanza**



5. **Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti**
6. **Medici e personale sanitario** di assistenza
7. **Familiari e contatti** di soggetti ad alto rischio
8. **Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo** (forze di polizia incluse polizie municipali, forze armate, vigili del fuoco e personale della protezione civile, addetti poste e telecomunicazioni, volontari servizi sanitari di emergenza, personale di assistenza case di riposo, personale asili nido, insegnanti)
9. **Personale** che, per motivi di lavoro, è a **contatto con animali** che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (allevatori, addetti macellazione, veterinari)

MI VACCINO PERCHÉ?

- Il vaccino è efficace e ben tollerato
- L'influenza e le sue complicanze possono essere tutt'altro che banali
- Riduco il rischio di contagiare le persone deboli a me vicine (anziani, bambini, persone affette da malattie croniche) nei luoghi di vita e di lavoro



DOVE SI EFFETTUANO LE VACCINAZIONI?

Negli **studi** dei **Medici di famiglia**, dei **Pediatri di libera scelta** per i bambini e presso i **Medici di Sanità pubblica** nei **poliambulatori** e **consultori** dei distretti