

## A CHI È CONSIGLIATA LA VACCINAZIONE?

- 1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni
- 2. Soggetti in età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da:
  - malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma persistente, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e le broncopatie cronico ostruttive - BPCO)
  - malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
  - diabete mellito e altre malattie metaboliche
  - malattie renali con insufficienza renale
  - malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
  - tumori
  - malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
  - malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
  - patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
  - patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad esempio malattie neuromuscolari)
- 3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
- 4. Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo mese di gravidanza

- 5. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
- 6. Medici e personale sanitario di assistenza
- 7. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
- 8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze di polizia incluse polizie municipali, forze armate, vigili del fuoco e personale della protezione civile, addetti poste e telecomunicazioni, volontari servizi sanitari di emergenza, personale di assistenza case di riposo, personale asili nido, insegnanti)
- 9. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (allevatori, addetti macellazione, veterinari)

## MI VACCINO PERCHÉ?

- Il vaccino è efficace e ben tollerato
- L'influenza e le sue complicanze possono essere tutt'altro che banali
- Riduco il rischio di contagiare le persone deboli a me vicine (anziani, bambini, persone affette da malattie croniche) nei luoghi di vita e di lavoro



## **DOVE SI EFFETTUANO LE VACCINAZIONI?**

Negli studi dei Medici di famiglia, dei Pediatri di libera scelta per i bambini e presso i Medici di Sanità pubblica nei poliambulatori e consultori dei distretti